



## อาการแทรกซ้อน

ผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะผู้สูงอายุ

เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น

โรคปอดหรือหัวใจ อาจเกิดอาการ

แทรกข้อน เช่น ปอดบวม

หลอดลมอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ

ได้มากกว่าคนอื่น ๆ และอาจมี

อาการรุนแรงลึกลับขึ้นเสียบวิตได้

## การรักษา

ใช้การรักษาตามอาการเป็นหลัก  
ควรดูแลตนเองในเบื้องต้น

- กินยาลดไข้ เช็คตัวด้วยน้ำ準 thermometer
- นอนพักมากๆ ในที่ที่อากาศถ่ายเท  
ได้สะดวก อากาศอบอุ่น ไม่ชื้นเกินไป
- ดื่มน้ำมากๆ งดดื่มน้ำเย็น
- รับประทานอาหารอ่อน เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม นม และควรเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ รสไม่จัด
- รับประทานผลไม้ หรือดื่มน้ำผลไม้มาก ๆ เช่น ผั่ง ลิ้ม ซึ่งให้วิตามินซีสูง
- หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน หรือ หอบ เหนื่อย ต้องรีบพบแพทย์ทันที  
โดยเฉพาะเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุ
- กรณีผู้ป่วยสูงอายุและเด็กเล็กที่มีอาการรุนแรงมากต้องรีบพบแพทย์ทันที และ  
หากรับประทานอาหารได้น้อย อาจให้วิตามินเสริมรวมทั้งวิตามินซี

## การป้องกัน

รักษาร่างกายให้แข็งแรง เพื่อให้ร่างกายสามารถ  
สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคได้ดี โดย

- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
- อุ่นในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
- หลีกเลี่ยงความเครียด บุหรี่ สุรา และยาเสพติด
- ระวังรักษาร่างกายให้อบอุ่นในช่วงอากาศหนาวเย็นหรืออากาศเปลี่ยนแปลง
- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ผัก และผลไม้ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหาร  
และวิตามินเพียงพอ

## ระมัดระวังการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน และช่วงอากาศเย็นซึ่งมักมี  
การแพร่กระจายโรคได้มากขึ้น โดย...

- ไม่คุยกับลูกหลานกับผู้ป่วย
- ไม่ใช้แก้วน้ำ หลอดดูด ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ ร่วมกับผู้อื่น  
โดยเฉพาะลิ้งของผู้ป่วย
- ใช้ขอนกลางทุกครั้ง เมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
- หม่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดี
- หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมาก และอากาศถ่ายเทไม่สะดวก
- ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ควรระมัดระวังไม่แพรเชื้อ โดยไม่โอกาสติดผู้อื่นและ  
ใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากทุก ครั้งเมื่อไอจาม หรือสวมหน้ากากป้องกันโรค  
หม่นล้างมือบ่อย ๆ และไม่คุยกับผู้อื่น

## พัฒนาระบบในครอบครัว

เป็นพฤติกรรมสุขอนามัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากการออกกำลังกาย

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ

ปิด ปิดปากจมูกเมื่อป่วย ไอจามใช้กระดาษทิชชู สวมหน้ากากป้องกันโรค หรือไอใส่ต้นแขนตนเอง

ล้าง ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนรับประทานอาหาร หลังไอจาม ลิ้งน้ำมูก คุณผู้ป่วยขับถ่าย จับต้องสัตว์ ล้างเข็มทำความสะอาด  
ลิ้งของพนักงานที่มีคนล้มพลิกมา

เลี้ยง เลี้ยงการอยู่ใกล้ผู้มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม เลี้ยงสถานที่คนมาอยู่ร่วมกัน  
จำนวนมาก (โดยเฉพาะช่วงที่มีโรคระบาดมาก)

หยุด หยุดงาน หยุดเรียน หยุดกิจกรรมกับผู้อื่น เมื่อป่วย เพื่อให้หายป่วยเร็ว  
และไม่แพรเชื้อให้คนอื่น

ฉีด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับกลุ่มเลี้ยงป่วยรุนแรง ตามคำแนะนำ  
ของกระทรวงสาธารณสุข

1422

สำนักงาน疾控中心

ศูนย์ควบคุมโรค

น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย  
สำหรับเด็ก

ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


<http://b eid.ddc.moph.go.th> โทร. 02-5903159

# โรคไข้หวัดใหญ่

1422



1422  
สายด่วนกรมควบคุมโรค



## อาการของโรค

หลังจากได้รับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เข้าสู่ร่างกาย ประมาณ 1-3 วัน โดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นเด็ก มักมีไข้สูงกว่าผู้ใหญ่ และอาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน และท้องเลี้ยดได้ ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่ มักมีอาการรุนแรง และป่วยนานกว่าไข้หวัดธรรมด้า แต่มักมีอาการดีขึ้นภายใน 5 วันหลังป่วย และหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน

## การติดต่อ

โรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง จากการไอหรือจามรดกัน หรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือ ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ ที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วย นอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจ เอาเชื้อไวรัสในฟอยล์ของน้ำมูก น้ำลายที่พุ่งกระจายอยู่ในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูก และปาก และสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วัน นับจากเริ่มป่วย

## สาเหตุการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่

เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งอยู่ในน้ำมูกและเสมหะ ของผู้ป่วย การแพร่ติดต่อเกิดขึ้นได้ง่ายในระหว่างผู้ใกล้ชิด ที่อยู่ในสถานที่แออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น โรงพยาบาล รถโดยสาร และอาคารบ้านเรือน ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ



## โรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่ : เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจ เกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย มักพบการระบาดเป็นช่วงๆ โดยเฉพาะ ในหน้าฝนและหน้าหนาว โรคนี้มักมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา และมีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนได้มากกว่า

